

## Liste blühender Stauden

In der folgenden Liste sind Stauden angeführt, die bei Insekten, speziell bei Honigbienen (B), Wildbienen (WB), Hummeln (Hu), Wespen (We), (Schweb-)Fliegen (FI) und Schmetterlingen (Schm) sehr beliebt sind.

Deutscher Name	Botanischer Name	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe	Standort	Nektar und Pollen für
Alant	Inula i. S.	gelb	VII-IX	40-200	S	B, WB
Astern div.	Aster i. S.	blau, rosa	VI-XI	40-150	S	B, Hu, WB, Schm, We, FI
Berglauch	Allium montanum	rosa	VII-IX	20	S, trocken	B, Hu, WB
Bergminze	Calamintha nep.	rosa	VII-IX	40	S, trocken	B, Schm
Blutweiderich	Lythrum salicaria	karminrosa	VII-IX	80-100	S, feucht	B, WB, Hu, Schm, FI
Bohnenkraut	Satureja i. S.	weiß, rosa	VIII-X	20	S, trocken	B, Hu, FI, Schm
Christrosen	Helleborus i. S.	weiß, rot	II-IV	30-50	HSch	B, Hu
Currykraut	Helichrysum italicum	gelb	VII-IX	50	S, trocken	B, Hu, FI
Drachenkopf	Dracocephalum i. S.	blau, rosa	VI-VIII	30	S, trocken	Hu
Duftnessel	Agastache rugosa	lila, weiß	VII-IX	60-100	S, trocken	B, Hu
Edeldistel	Eryngium i. S.	blau	VII-IX	30-100	S, trocken	B, Hu, WB
Ehrenpreis	Veronica i. S.	blau	V-VIII	20-80	S, HSch	B, WB, FI
Färberkamille	Anthemis tinctoria	gelb	VI-IX	40	S, trocken	B, WB, FI
Fenchel	Foeniculum vulgare	gelb	VII-IX	80-100	S	WB, We, FI
Fetthenne	Sedum i. S.	div.	V-X	15-60	S, trocken	B, WB, Hu, We
Fingerhut	Digitalis i. S.	div.	VI-VIII	30-150	S, HSch	WB, Hu
Fingerkraut	Potentilla i. S.	div.	V-VIII	10-50	S	B, WB
Flockenblumen	Centaurea i. S.	lila	VI-VIII	40-80	S	B, WB, Hu, We, Schm
Gamander	Teucrium i. S.	rosa	VI-VIII	20-50	S, trocken	WB, Hu
Glockenblumen	Campanula i. S.	blau	VI-IX	20-100	S, HSch	B, WB, Hu
Goldrute	Solidago i. S.	gelb	VII-X	40-80	S	B, WB, We, FI, Schm
Graslilie	Anthericum liliago	weiß	V-VI	50	S, trocken	Schm
Habichtskraut	Hieracium aurantiacum	orangerot	VI-VIII	30	S	B, WB
Hauhechel	Ononis spinosa	rosa	VI-IX	40	S, trocken	B, WB
Hungerblümchen	Draba aizoides	gelb	III-IV	10	S, trocken	B, WB
Indianernesseln	Monarda i. S.	div.	VII-IX	80-130	S	B, Hu
Jakobsleiter	Polemonium caeruleum	blau	VI-VII	60	S, HSch	Schm
Junkerlilie	Asphodeline lutea	gelb	V-VI	50-100	S, trocken	Schm, Hu
Katzenminzen	Nepeta i. S.	violett, rosa	VI-IX	30-80	S	B, Hu, WB
Knöterich	Polygonum i. S.	weiß, rosa	VI-IX	30-100	S, frisch	WB, FI, Schm
Königskerzen	Verbascum i. S.	div.	VI-IX	60-200	S, trocken	B, WB, FI
Kopflauch	Allium sphaerocephalon	weinrot	VI-VIII	40	S, trocken	B, Hu, WB
Kugeldistel	Echinops ritro	blau	VII-IX	80-100	S, trocken	B, WB, Hu, We, Schm
Kuhschelle	Pulsatilla vulgaris	violett	III-IV	20	S, trocken	B, Wb, Hu
Lavendel	Lavandula angustif.	violett	VI-VIII	30-60	S, trocken	B, Hu, Schm
Lein	Linum perenne	zartblau	VI-VIII	60	S, trocken	B, Hu
Leinkraut	Linaria purpurea	violett	VII-X	70	S, trocken	WB
Löwenmäulchen	Antirrhinum hisp.	weiß	VII-X	20	S, trocken	Hu

Lungenkraut	Pulmonaria i. S.	div.	III-V	20-50	HSch	Hu, WB, Schm
Mädchenauge	Coreopsis verticillata	gelb	VI-IX	50	S	B, Hu
Malven	Malva i. S.	rosa, weiß	VI-X	50	S	B, WB, Hu
Minzen	Mentha i. S.	rosa	VI-VIII	50-100	S	B, Hu, Schm, FI
Nelken	Dianthus i. S.	rosa, weiß	VI-IX	20-50	S	Schm
Nelkenwurz	Geum i. S.	gelb, orange	V-VII	20-40	frisch	B, WB
Ochsenauge	Anchusa azurea	blau	V-VI	100	S, trocken	Hu
Ochsenauge	Buphthalmum salicif.	gelb	VI-IX	50	S	B, WB
Odermennig	Agrimonia eupatoria	gelb	VI-VIII	40-50	S, HSch	B, Hu, FI
Oregano	Origanum vulgare	rosa	VII-IX	20-40	S, trocken	Hu, WB, We, FI
Prachtkerze	Gaura lindheimeri	weiß	VII-X	60-80	S, trocken	Schm
Präriemalve	Sidalcea i. S.	rosa, weiß	VI-VIII	70-90	S	B, WB, Hu
Rosenwaldmeister	Phuopsis stylosa	pink	VI-VIII	30	S, HSch	Schm
Salbei	Salvia i. S.	div.	V-X	40-80	S	Hu, WB, Schm
Samtnelke	Lychnis coronaria	karminrot	VI-VIII	60	S	Schm
Sandglöckchen	Jasione laevis	hellblau	VI-VII	40	S, trocken	B, WB
Scabiosen	Scabiosa i. S.	div.	VII-IX	30-70	S	B, WB, Hu
Scheinaster	Boltonia asteroides	weiß	VII-X	80-150	S	B, Hu
Schleifenblume	Iberis sempervirens	weiß	IV-V	20	S, trocken	B, Hu, Schm
Schönaster	Kalimeris incisa	weiß	VI-IX	60	S	B, Hu
Schuppenkopf	Cephalaria gigantea	gelb	VII-VIII	200	S, frisch	B, Hu
Seifenkraut	Saponaria i. S.	rosa	V-IX	30-80	S	Nachtfalter
Sommeranemone	Anemone in Sorten (i.S.)	weiß, rosa	VII-X	50-100	S, HSch	B
Sonnenauge	Heliopsis scabra	gelb, ein- fach	VII-IX	100	S	B, Hu
Sonnenblumen	Helianthus i. S.	gelb	VIII-IX	100-200	S	B, Hu, FI, Schm
Sonnenbraut	Helenium i. S.	gelb, rot	VII-IX	50-130	S	B, Hu, FI
Sonnenhut	Echinacea purpurea	rot, weiß	VII-IX	70	S	B, Hu, FI
Sonnenröschen	Helianthemum i. S.	div.	V-VIII	20	S, trocken	WB
Spornblume	Centranthus ruber	rot, weiß	VI-IX	50-80	S, trocken	B, Schm
Steinkraut	Alyssum saxatile	gelb	IV-V	15	S, trocken	B, WB
Sterndolde	Astrantia major	weiß	VI-VIII	60-80	HSch	B, Hu, FI, Schm
Stockrose	Alcea rugosa	gelb, ein- fach	V-IX	200	S, trocken	B, Hu
Storchschnabel	Geranium i. S.	rosa, weiß	VI-X	20-60	div.	B, WB
Teufelsabbiss	Succisa pratensis	blauviolett	VI-X	50	S, frisch	B, WB, Schm
Thymian	Thymus i. S.	rosa, weiß	V-IX	5-20	S, trocken	B, Hu, We, Schm
Vergissmeinnicht	Brunnera macrophylla	blau	IV-VI	40	HSch	WB, FI, Sch
Wasserdost	Eupatorium i. S.	rosa, weiß	VII-X	60-200	S, frisch	B, Schm
Weidenröschen	Epilobium angustif.	rosa	VII-IX	100	S, frisch	WB, Hu, Schm
Witwenblume	Knautia macedonica	weinrot	VII-IX	70	S, trocken	B, Hu, WB, FI
Wolfsmilch	Euphorbia i. S.	gelb	IV-IX	20-120	S	Schm, FI
Ysop	Hyssopus officinalis	blau	VII-VIII	50	S, trocken	B, Hu

Diese Liste ist mit Sicherheit nicht vollständig; sie sollte lediglich bei der Zusammenstellung Ihrer Staudenpflanzung hilfreich sein, wenn es darum geht, zahlreiche Insekten in Ihren Garten zu locken.

(Weitere Informationen finden Sie auch unter „Der blühende Staudengarten“, „Blütenbesuchende Insekten im Garten“ u.a.)

Informationen und Bezugsquelle für insektenfreundliche Stauden:  
Die Gärtnerei am Karpfenteich, Daniela Riegler  
Rumleshof 2, 92342 Freystadt, Tel. 09179 1228  
info@stauden-riegler.de - www.stauden-riegler.de

#### Staudenliste – Stand Juni 2006

Netzwerk Blühende Landschaft - Solla 6 - 94575 Windorf - Fax 08541-915473  
www.bluehende-landschaft.de info@bluehende-landschaft.de